

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

CALTIX PLUS

Ürün	Dozajı (gr./dekar)	Uygulama Zamanı
Domates, salatalık, kabak	500 - 1,000	Çiçeklenmeyle beraber başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Biber	400 - 800	Çiçeklenmeyle beraber başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Lahana, karnabahar, Brüksel lahanası	400 - 800	Erken dönemde başlanıp 7 - 10 gün aralıklarla uygulanır.
Marul	400 - 800	Baş oluşumuyla başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Havuç	400 - 800	Meyvaların oluşmasıyla beraber başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla 2-3 kez uygulanır.
Patates	400 - 800	Eksiklik görüldüğünde 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Pamuk	400 - 800	Tarak teşekkülüyle başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Meyvalar (Şeftali, elma, turuncgiller vs.)	450 - 900	Meyva tutumundan sonra başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır. Uygulama hasattan 10-14 gün önce kesilir.
Bağ	400 - 800	İlk meyvalar oluşuktan sonra başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Karpuz	400 - 800	İlk çiçek oluşumuyla beraber başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.
Çilek	300 - 600	Çiçeklenmeyle beraber başlanıp 10 - 14 gün aralıklarla uygulanır.

**ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ.**



DİKKAT: ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ

Depolama: Dondan ve direkt güneş ışınlarından koruyarak +5°C ile +45°C arasındaki oda sıcaklığında depolayınız. Normal şartlar altında depolanan gübre 3 sene süreyle tüm özelliklerini muhafaza eder. Boşalan ambalajlar başka maksatlarla kullanılmaz.

Karışımın Hazırlanışı: Tankı yarısına kadar suyla doldurup yeterli miktarda **Caltix Plus**'ı ilave ederek karıştırınız. Daha sonra tankı tamamen suyla doldurduktan sonra vakit kaybetmeden uygulama yapılır. Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız. Uygulama serin saatlerde yapılmalıdır.

Karışılabilirlik: **Caltix Plus**; birçok zirai ilaç ve fungusitlerle karışabilir, ancak alkali karışımlarla ve bordo bulamacıyla kullanmayınız. Tereddüt halinde ön deneme yapılmalıdır.

Caltix Plus; birçok sebze, meyva ve bahçe bitkilerinde görülen bitki besin maddesi dengesizliği ve Kalsiyum eksikliğinde düzeltme amaçlı kullanılır.

- ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
- ÜRÜNÜN BUHARINI VE ZERRELERİNİ TENEFFÜS ETMEYİNİZ.
- GÜBRELEME ESNASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN GÖZLÜK KULLANINIZ.
- DERİ VEYA GÖZ İLE TEMASINDA BOL SU İLE YIKAYINIZ.
- YUTULMASI HALİNDE MEDİKAL TEDBİRLER ALINMALIDIR.